

தடுப்பூசி மருந்து RRO
சின்னம்மை, கொப்புளிப்பான், கூகைக்கட்டு போன்ற நோய்களுக்கு எதிரான
கூட்டுத் தடுப்பூசி மருந்து

«தடுப்பூசியேற்றம் ஒரு சிறந்த பாதுகாப்பாகும்»

சின்னம்மை, கொப்புளிப்பான், கூகைக்கட்டு மற்றும் அவற்றால் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களில் இருந்து இத்தடுப்பூசி மருந்தைப் பெறுபவர் பாதுகாக்கப்படுகிறார்.

	சின்னம்மை	கொப்புளிப்பான்	கூகைக்கட்டு
நோய்கள்	சின்னம்மையின் விளைவுகள் : - செந்நிறத் தோல்திட்டுகள் - இருமல் - காய்ச்சல் - விழிவெண்படல அழற்சி (விழிகள் சிவத்தல்) - உடல் முழுவதும் பொதுவாக மாற்றமான தன்மை	கொப்புளிப்பானின் விளைவுகள்: - செந்நிறத் தோல்திட்டுகள் - நரம்புத் திரள் வீக்கம் - மூட்டு வாதம் (முக்கியமாகப் பெண்களிடத்தில்)	கூகைக்கட்டின் விளைவுகள்: - காய்ச்சல் - தலைவலி - தாடையின் கீழ் இருக்கும் ஓமோன் சுரப்பிகளின் வீக்கம்
	சின்னம்மையினால் உருவாகக் கூடிய சிக்கலான விளைவுகள்: - செவியழற்சி (5 இலிருந்து 9% நிகழ்வுகளில்) - மார்சளிக்காய்ச்சல் (1 இலிருந்து 5% நிகழ்வுகளில்) - வலிமாந்தம் - மூளையில் நிரந்தர பாதிப்புக்கள் (1000 இல் ஒரு நிகழ்வு) - இறப்பு (3000இல் ஒரு நிகழ்வு)	கொப்புளிப்பானால் உருவாகக் கூடிய சிக்கலான விளைவுகள் : - கற்பவதிகளின் கருச்சிதைவு ; - கொப்புளிப்பானுக்கு ஆளான கற்பவதிகளின் சிசுக்களின் இயல்பற்ற உருவ வளர்ச்சி	கூகைக்கட்டினால் உருவாகக் கூடிய சிக்கலான விளைவுகள் : - மூளைக்காய்ச்சல் (10 இலிருந்து 30 % நிகழ்வுகளில்) - செவிட்டுத்தன்மை - விந்தக அழற்சி - கருவக அழற்சி

தடுப்பு மருந்து

சின்னம்மை, கொப்புளிப்பான், கூகைக்கட்டு போன்ற நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதற்கு தடுப்பு மருந்து ஏற்றுவதே சிறந்த வழியாகும். இப்பாதுகாப்பு வாழ்நாள் முழுவதும் நிலைக்கும். குழந்தைகளுக்கு RRO எனப்படும் இத்தடுப்பு மருந்து அவர்களின் வயது 12 மாதமாகவும், 18 மாதமாகவும் இருக்கையில் அளிக்கப்படும்.

RRO எனும் தடுப்பு மருந்தானது பாதுகாப்பானது. பெரும்பான்மையான எதிர்விளைவுகள் சாதுவாகவும், குறுகிய காலத்தில் மறைந்தும் விடும். தென்படும் அறிகுறிகள் தடுப்பு மருந்தினால் தான் உருவானது என்ற அவசியமில்லை. தடுப்பு மருந்து பெறும் பெண்கள் தொடர்ந்து வரும் மாதத்தில் கருத்தரிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

	தடுப்பு மருந்தினால் வரக்கூடிய எதிர்விளைவுகள்	செய்ய வேண்டியவை
எதிர்விளைவுகள்	- ஊசி குத்திய இடத்தில் வலி, சிவந்த தன்மை, வீக்கம் (1 இலிருந்து 9% வரை) போன்றவை. - தடுப்பு மருந்து பெற்ற 5ம் நாளிலிருந்து 12ம் நாட்களுக்குள், சாதுவான காய்ச்சல் (10 இலிருந்து 49% வரை) மற்றும் தொற்றும் தன்மையற்ற செந்நிறத் திட்டுக்கள் (1 இலிருந்து 9% வரை) - கடுமையான காய்ச்சல் (1 இலிருந்து 9% வரை), நடுக்கம், (1000 இற்கு 1 இலிருந்து 9 வரை), வலிப்புக்கள் (10,000 இற்கு 1 இலிருந்து 9 வரை). - எரிச்சல், தாக்கச் சோர்வு, விழிவெண்படல அழற்சி, வயிற்றோட்டம் (1 இலிருந்து 9 வரை).	- ஊசி ஏற்றப்பட்ட இடத்தில் ஈரமான, குளிர் ஒத்தடம் தரவும். - உடல் வெப்பநிலை 38.5°C அல்லது கூடுமானால் acétaminophène அல்லது ibuprophène போன்ற மருந்து வகையில் ஒன்றினைப் பாவிக்கவும்.
	- மூட்டுக்களில் வலி (பிள்ளைகளுக்கு 1 இலிருந்து 9% வரையும், பெரியவர்களுக்கு 10 இலிருந்து 49% வரையும்). - நரம்புத் திரள் வீக்கம் மற்றும் தாடை அருகே இருக்கும் ஓமோன் சுரப்பிகளின் வீக்கம் (100,000 இற்கு 1 இலிருந்து 9 வரை). - இரத்த உறைதலுக்கு உதவும் குருதி அணுக்களின் தற்காலிக	- அறிகுறிகளின் உக்கிரத்தைப் பொறுத்து வைத்தியரின் ஆலோசனையை நாடவும். -