

## VACCIN RRO

### Chủng ngừa kết hợp chống bệnh sởi, ban đỏ nổi hạch và quai bị

#### « Chích ngừa, sự phòng chống tốt nhất »

Người được chích thuốc ngừa này sẽ phòng chống được bệnh sởi, ban đỏ nổi hạch, quai bị cùng những biến chứng của các bệnh trên.

	Sởi	Ban đỏ nổi hạch	Quai bị
	<b>Bệnh sởi gây nên :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- nốt đỏ</li><li>- ho</li><li>- sốt</li><li>- viêm kết mạc (mắt đỏ)</li><li>- gây hại trạng thái chung</li></ul>	<b>Ban đỏ nổi hạch gây nên :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- nốt đỏ</li><li>- sưng hạch</li><li>- viêm khớp (nhất là ở phụ nữ)</li></ul>	<b>Quai bị gây nên :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- sốt</li><li>- nhức đầu</li><li>- sưng tuyến ngoại tiết gần hàm</li></ul>
<b>Các bệnh</b>	<b>Những biến chứng có thể có ở bệnh sởi là :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- viêm tai (5 đến 9 % trường hợp)</li><li>- viêm phổi (1 đến 5 % trường hợp)</li><li>- cơn co giật</li><li>- tai hại bất biến ở óc (1 trong 1000 trường hợp)</li><li>- chết người (1 trong 3000 trường hợp)</li></ul>	<b>Những biến chứng có thể có là :</b>  Sảy thai ở đàn bà có mang ; Các dị tật bẩm sinh ở đứa bé mà người mẹ đã bị bệnh ban đỏ nổi hạch lúc thai nghén.	<b>Những biến chứng có thể có ở bệnh quai bị là :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- viêm màng não (10 đến 30 % trường hợp)</li><li>- tật điếc</li><li>- nhiễm trùng hòn đáí</li><li>- nhiễm trùng buồng trứng</li></ul>

## CHỨNG NGỪA

Chích ngừa là phương pháp tốt nhất để phòng chống bệnh sởi, ban đỏ nổi hạch và quai bị. Sự phòng chống này kéo dài cả cuộc đời. Các trẻ em nhận sự chích ngừa RRO ở tuổi 12 tháng và 18 tháng.

Chủng ngừa RRO là an toàn. Phần đông các phản ứng thì nhẹ và ngắn hạn. Những triệu chứng cảm nhận được không nhất thiết do bởi thuốc chủng ngừa. Phụ nữ được chích ngừa phải tránh không để có thai một tháng kế tiếp sau khi chích ngừa.