



RRO 疫苗

預防麻疹、風疹、流行性腮腺炎的聯合疫苗

“接種疫苗是一種很有效的預防手段”。

接受這種疫苗接種的人能夠預防麻疹、風疹、流行性腮腺炎及其並發症。

	麻疹 (Rougeole)	風疹 (Rubéole)	流行性腮腺炎 (Oreillons)
疾病	麻疹會導致: <ul style="list-style-type: none"> - 紅斑 - 咳嗽 - 發燒 - 結膜炎 (紅眼睛) - 全身受到侵襲 	風疹會導致: <ul style="list-style-type: none"> - 紅斑 - 淋巴結腫脹 - 關節炎 (尤其是婦女) 	流行性腮腺炎會導致: <ul style="list-style-type: none"> - 發燒 - 頭痛 - 靠近頰部的淋巴結腫脹
	麻疹可能引起的並發症: <ul style="list-style-type: none"> - 耳炎 (5%到9%的病例) - 肺炎 (1%到5%的病例) - 痙攣 (或叫抽搐) - 永久性腦損傷 (1000個病例中有1例) - 死亡 (3000個病例中有1例) 	得了風疹的 孕婦 有較大的流產危險, 或是產下的嬰兒會帶有以下病症的危險: <ul style="list-style-type: none"> - 耳聾 - 喪失視覺 - 心臟畸形 - 智力遲緩 - 腦損傷 - 其他嚴重問題, 包括死亡 	流行性腮腺炎可能引起的並發症: <ul style="list-style-type: none"> - 腦膜炎 (10%到30%的病例) - 耳聾 - 睪丸感染 - 卵巢感染

疫苗

接種疫苗是預防您的孩子得麻疹、風疹、流行性腮腺炎的最佳手段。這種疫苗能夠同時防禦這三種疾病, 而且是終身防禦。孩子應在 12 個月和 18 個月的時候接受 RRO (麻疹、風疹、流行性腮腺炎) 疫苗的接種。

RRO 疫苗是安全的。在大多數情況下, 牠不會誘發任何的不良反應。婦女在接受這種疫苗接種之後的一個月內應避免懷孕。

	對疫苗可能產生的反應	應該怎樣做
反應	- 受接種者在注射過的地方可能會出現紅腫和感覺敏感。	- 在注射疫苗的地方敷一塊潮濕的冷紗布。
	- 有時候, 在接種之後的第5天到第12天之間, 受接種者會輕微發燒, 並出現不會傳染的紅斑。發高燒的情況很少。可能會因為發高燒而使孩子出現痙攣的情況。	- 如果體溫達到攝氏38.5度以上, 可服用撲熱息痛的 (解熱鎮痛) 類退燒藥。
	偶尔情況下, 靠近頰部的淋巴結會出現腫脹, 或是在接種之後的幾星期內可能會出現關節疼痛。	
	据報告, 在很少情況下, 有助於血液凝結的血細胞會暫時減少。	
	据報告, 100萬份劑量中有不到1份劑量的比例會出現神經系統的問題。	
	嚴重的過敏反應屬極少情況。	
	如要發生嚴重的過敏反應, 那麼在注射之後的幾分鐘就會開始, 執行注射者懂得處理這種反應。因此, 要求受接種者在注射後至少在現場逗留 15 分鐘。	

如想瞭解更多的情況, 請詢問疫苗注射者, 或者去您居住區的 CSSS (醫療衛生與社會服務中心) 屬下的 CLSC (當地居民社區服務中心) 就診, 也可去找醫生。